

# 室內無線電話增患癌風險

[http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20110702/00176\\_067.html](http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20110702/00176_067.html)

繼世界衛生組織研究指使用手機可增患腦癌後，瑞典一項研究進一步指出，除了手提電話會令人罹患腦瘤的機會大增五倍之外，就連室內無線電話亦令患癌風險大幅增加四倍。有腫瘤科專家建議，青少年及兒童宜盡量減少長時間「煲電話粥」，以免輻射增加患癌風險。

最新一期《國際腫瘤期刊》刊登的一篇文章指，瑞典奧雷布洛大學醫院及于默奧大學的研究人員，曾訪問約一千二百五十名瑞典腦癌患者，了解他們使用手機及室內無線電話的習慣，當中九百零五名受訪人士仍然在世；其餘已經辭世的患者，則透過訪問他們的親人以了解死者的習慣。同時，研究人員亦訪問了二千五百名沒有患癌的瑞典人為「控制組」，以作比較。



- [外國研究指出，除了用手機可能致癌，室內無線電話亦可致癌。](#)

[\(資料圖片\)](#)

結果發現，於青少年時期開始使用手機，使用了最少十年的人士，患腦神經膠質瘤比率，較控制組高出四點九倍；而使用室內無線電話的人，患腦神經膠質瘤比率，亦較控制組高出三點九倍。

### 青少兒童宜少煲電話粥

以兩組受訪者的結果作比較，更發現無論是使用手機或室內無線電話持續十年，患惡性腫瘤的機會率會增加三成，患腦神經膠質瘤的機會率則上升四成。當地健康部門便提醒民眾，十六歲以下青少年及兒童，應減少使用手機，並把通話時間盡量縮短，也可使用免提裝置。

本港臨床腫瘤科專科醫生應志浩表示，首次聽聞有關室內無線電話可能致癌的研究，不過早前世衛將手機列為可能致癌類別，他亦懷疑其他類型的無線電話可能潛藏相同問題。他指手機或無線電話會釋出輻射，建議市民可考慮使用有線電話；兒童的腦部未完全發育，亦應避免長時間用手機，減低患癌風險。

世衛上月初公布一項跨十三國的研究指，若連續七年每天使用手機十五分鐘，患腦神經膠質瘤風險會飆升七成二。

